

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 93 -

26 JUIN 1968

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

CARPOCAPSE - Les pontes les plus importantes ont eu lieu entre le 16 et le 23 Juin. Les éclosions correspondantes devraient commencer à partir du 28 Juin et se poursuivre au cours de la première semaine de Juillet.

Durant cette période, considérée comme très critique, les fruits devront être parfaitement protégés contre les attaques des jeunes chenilles.

En conséquence, un traitement devra être réalisé :

- dès que possible dans les vergers ayant été traités au cours de la semaine du 10 au 16 Juin.
- dès les premiers jours de Juillet dans ceux ayant été protégés durant celle du 17 au 23 Juin.

TAVELURES - Les conditions climatiques de ce printemps ayant permis des "repiquages", nous préconisons d'adjoindre un fongicide anti-tavelure à la bouillie insecticide destinée à lutter contre le carpocapse.

POMME DE TERRE

MILDIOU - Les conditions climatiques continuent d'être très favorables au développement de la maladie.

Les pluies de Samedi et de Lundi derniers ayant permis de nouvelles contaminations, il faut s'attendre, dès la fin de cette semaine ou au tout début de la suivante, à l'apparition d'une grande quantité de taches sur les variétés sensibles et insuffisamment protégées. Les germes (conidies) produits sur ces taches vont constituer un nouveau risque très grave pour les cultures voisines.

Par ailleurs, les fanes se sont encore développées activement et les nouvelles feuilles ne sont pas protégées contre les contaminations.

Enfin, les pluies, localement importantes, ont lessivé en partie le produit appliqué suivant notre dernier avis.

Il est donc indispensable d'assurer une nouvelle couverture fongicide des fanes de pommes de terre. Réaliser ce traitement dans les meilleurs délais.

TOMATE

MILDIOU - Le climat étant favorable à cette affection, les cultures de tomate doivent être préservées par un traitement effectué dès que possible.

ECHALOTE - OIGNON

MILDIOU - Il est nécessaire d'exécuter un nouveau traitement contre cette maladie, dans les prochains jours.

L'Ingénieur chargé des
Avertissements Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.